

Bắc Ninh: Khẩn trương chăm sóc cây ăn quả sau lũ

05:59 16/10/2025

Do ảnh hưởng của mưa bão gây ngập lụt, nhiều vườn cây ăn quả bị thiệt hại nghiêm trọng. Để khẩn trương khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp chăm sóc cây ăn quả.

Theo đó, cần tiêu thoát nước nhanh chóng và vệ sinh vườn. Với những vườn bị ngập úng, bà con nên đào rãnh, khơi thông dòng chảy, bơm hút nước ra khỏi hố và vườn cây, tránh để nước ngập lâu gây thối rễ.



Vườn cây ở xã Nhã Nam bị ảnh hưởng sau mưa lũ.

Đồng thời loại bỏ rác bám trên cây để tránh tổn thương và ngăn ngừa nguồn bệnh. Dùng máy bơm phun nước rửa sạch bùn đất bám trên lá giúp tăng khả năng quang hợp và phòng trừ bào tử nấm bệnh. Sau đó, thu dọn vệ sinh vườn tấp, thu gom quả bị rụng và tiêu hủy ngay những cây bị vàng lá, rụng lá, thối rễ nặng không có khả năng hồi phục.

Với cây đang trong thời kỳ thu hoạch, cần tập trung thu nhanh gọn để giảm thiệt hại, sau đó cắt tỉa bớt cành. Với cây đang phát triển quả, nếu thời gian ngập ngắn (cây còn xanh) thì cắt tỉa bớt chùm quả; nếu ngập dài (trên 2 ngày) cần cắt toàn bộ quả và tỉa bớt cành để cây tập trung dinh dưỡng hồi phục.

Đối với cây bị gãy cành, nếu mức độ nhẹ (dưới 1/3 tán cây), chỉ cần cắt bỏ cành gãy; nếu nặng (trên 1/3 tán cây) thì cắt toàn bộ cành gãy nhưng giữ lại cành còn lá để cây phục hồi. Cây bị đổ cần được cắt tỉa bớt cành, dựng thẳng gốc và dùng cọc chống để cố định.

Với cây bị long gốc, cần dặm chặt, vun gốc và xử lý các vết thương lớn bằng dung dịch sát khuẩn như nước vôi hoặc thuốc bảo vệ thực vật có chứa gốc đồng. Sau khi nước rút và đất khô ráo, bà con nên xới nhẹ lớp đất mặt (5-10 cm) quanh gốc để phá váng, tạo độ thông thoáng, giúp rễ hút oxy và tái sinh. Đồng thời cần phòng trừ nấm bệnh bằng cách rắc vôi bột, tưới thuốc nấm, thuốc trừ rệp sáp và tuyến trùng tại khu vực cây bị tiêu hủy để khống chế nguồn bệnh.

Khoảng 7-10 ngày sau khi nước rút, khi đất không còn quá ẩm, bà con tiến hành bón phân hữu cơ hoai mục kết hợp chế phẩm sinh học (như Trichoderma) hoặc phân vi sinh theo hình chiếu tán cây, hạn chế dùng phân hóa học và tuyệt đối không dùng phân đạm để tránh ngộ độc.

Khi bộ rễ tơ bắt đầu hồi phục (khoảng 10-15 ngày sau bón phân hữu cơ), có thể bón phân NPK tổng hợp cân đối và phun bổ sung phân bón qua lá, đặc biệt là loại chứa trung-vi lượng (như Fe, Bo, Ca, Cu, B, Zn...) để cây phát triển tốt, tránh hiện tượng nứt và rụng quả. Sau mưa bão, các bộ phận của cây bị tổn thương là điều kiện thuận lợi để sinh vật gây hại như nấm và vi khuẩn xâm nhập, vì vậy bà con cần thường xuyên theo dõi diễn biến sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

Bá Đoàn