TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chữa bàn chân khoèo bẩm sinh cho bé sơ sinh 3 ngày tuổi

03:39 10/05/2020

Sáng ngày 09/5, khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã thực hiện phục hồi chức năng bàn chân khoèo bẩm sinh bằng phương pháp Ponseti cho bé sơ sinh 3 ngày tuổi.

Trước đó, vợ chồng chị N.T.H tại Hà giang sau khi sinh đôi hai bé gái tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Tuy nhiên vợ chồng anh chị rất lo lắng khi các nữ hộ sinh cho biết một trong hai bé khi được sinh ra, đôi chân của bé đã ứng



Bé gái bị mắc chứng bệnh chân khoèo bẩm sinh

Ngay lập tức bé gái được đưa vào điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa Hùng Vương , một cuộc hội chẩn liên khoa đã diễn ra. Ngay sau đó các bác sỹ đưa ra chỉ định chữa trị bằng phương pháp Ponseti nắn chỉnh nhẹ nhàng, bó bột để duy trì kết quả nắn. Các bước nắn và bó bột này được lặp lại mỗi tuần, trong vòng 6-7 tuần. Dần dần bàn chân sẽ trở về hình dạng bình

thường.

Sau khi tháo bột lần cuối, bé cần mang đôi nẹp giầy, có gắn trên một thanh nằm ngang để ngăn ngừa tái phát. Nẹp giầy được sử dụng cả ngày lẫn đêm trong 3 tháng đầu tiên và tiếp tục mang ban đêm trong 3 năm. Nếu tuân thủ đúng theo phác đồ điều trị, các cháu bé sẽ khỏi bệnh hoàn toàn, tình trạng khoèo chân sẽ biến mất.

Các bác sỹ Khoa chấn thương chỉnh hình cho biết Bàn chân khoèo bẩm sinh là một dị tật bàn chân đã xảy ra trong thời gian người mẹ đang mang thai. Do đã xảy ra trong thời gian trước sinh nên gọi là bẩm sinh. Nguyên nhân gây ra tật này là do tư thế nằm trong bụng mẹ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bào mầm



các bác sỹ đang nắn chỉnh nhẹ nhàng, bó bột để duy trì kết quả nắn

Bé bị khoèo chân có biểu hiện: chân vòng kiềng (chân cong); bàn chân bị nghiêng ngoài; khoèo chân; gối quặt ngược... khám ngoại hình thường dễ phát hiện dị tật bẩm sinh ngay sau sinh. Các nghiên cứu cho biết có một tỷ lệ nhất định trẻ bị khoèo chân bẩm sinh. Vì vậy trong thời kỳ mang thai, thai phụ cần khám thai định kỳ để phát hiện sớm các dị tật của thai nhi. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm khi bé vừa chào đời thì vẫn có khả năng phục hồi lên đến 90%. Phương pháp điều trị chủ yếu là chỉnh hình tật chân khoèo bẩm sinh. Việc này tuy đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều công phu và kinh nghiệm, vì vậy hãy chọn lựa những cơ sở, dịch vụ uy tín để thực hiện chữa bệnh cho bé.