

Bộ Y tế hướng dẫn xử trí phản ứng phản vệ khi tiêm vaccine COVID-19

14:43 25/05/2021

Bộ Y tế vừa có văn bản số 4198/BYT-KCB gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ sở y tế thuộc các bộ, ngành để hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ khi tiêm vaccine phòng COVID-19.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19, nhằm phát hiện và xử trí kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Ban Chỉ đạo An toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện khám sàng lọc theo Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca ban hành kèm theo Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, tuân thủ đầy đủ các nội dung của việc khám sàng lọc trước tiêm chủng, lưu ý đối với các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng.

Các đơn vị thực hiện cần xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine COVID-19 theo các Hướng dẫn chuyên môn (Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vaccine COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Để phòng phản ứng phản vệ có thể xảy ra khi tiêm vaccine phòng COVID-19, tránh mất thời gian lấy thuốc ra khỏi tủ hoặc hộp thuốc vì diễn biến phản ứng phản vệ rất nhanh, mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm vaccine và tại khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng phải chuẩn bị sẵn 1 bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp).

Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy...) thì phải tiêm ngay 1/2mg Adrenalin

tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT.

Khi kết thúc buổi tiêm chủng, nếu không sử dụng đến thì cần phải hủy bỏ bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml.

Các đơn vị cần khẩn trương tổ chức cấp cứu theo hướng dẫn nói trên và đồng thời báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh), đặc biệt là các trường hợp cần hội chẩn trực tuyến đặc thù.

Hoan Nguyễn