

Cà Mau hướng dẫn tiêm liều cơ bản, nhắc lại lần 1, nhắc lại lần 2 các loại vắc xin phòng Covid-19

17:16 22/06/2022

Thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Sở Y tế tỉnh đã có hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Cà Mau; các bệnh viện công lập, ngành, tư nhân; Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn tiêm liều cơ bản, nhắc lại lần 1, nhắc lại lần 2 các loại vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.



Sau thời gian từ 4 đến 6 tháng, miễn dịch ở người tiêm vắc xin Covid-19 sẽ giảm, làm tăng nguy cơ mắc Covid-19 ở người. (Ảnh: KT)

Theo đó, để chủ động phòng, tránh nhiễm, tái nhiễm Covid-19, Sở Y tế Cà Mau yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19; khoảng cách thời gian, số liều, mũi tiêm, cụ thể:

Cụ thể, đối với liều cơ bản: Vắc xin Vero Cell: Tiêm 3 mũi cùng loại vắc xin hoặc

2 mũi Vero Cell + thêm loại vắc xin khác (tức 3 mũi vắc xin theo lịch ngày 0 - 21 - 49, sau mũi 2 là 28 đến 90 ngày).

Các loại vắc xin khác (AstraZeneca, Pfizer, Moderna): Tiêm 2 mũi vắc xin theo lịch mũi 2 cách mũi 1, AstraZeneca và Moderna khoảng 28 ngày, Pfizer khoảng 21 ngày.

Lưu ý: Đối với các trường hợp mắc Covid-19, người trên 18 tuổi thì tiêm ngay sau hồi phục và hoàn thành việc cách ly (theo mục e, khoản 1, công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021); người từ 5 đến dưới 18 tuổi thì tiêm khi trẻ khỏi bệnh ≥ 3 tháng (theo mục 2 của Công văn số 1848/BYT-DP ngày 13/04/2022). Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng thì tiêm mũi bổ sung vẫn tính là liều cơ bản.

Đối với, liều nhắc lại lần 1 (là mũi 3 gồm AstraZeneca, Pfizer, Moderna; nếu tiêm vắc xin Vero Cell là mũi 4)

Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên: Ít nhất 3 tháng sau mũi tiêm cuối cùng liều cơ bản (ở phần 1 liều cơ bản).

Lưu ý với các trường hợp người từ 18 tuổi đã mắc Covid-19: Thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo qui định (theo mục e, khoản 1, công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021).

Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...: Cộng thêm 1 mũi do tiêm mũi bổ sung (nếu tính số mũi tiêm).

Liều nhắc lại lần 2 (là mũi 4 gồm AstraZeneca, Pfizer, Moderna; nếu tiêm vắc xin Vero Cell là mũi 5).

Tiêm cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên; khoảng cách mũi tiêm theo mục c, công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/05/2022; người không mắc bệnh ít nhất 4 tháng sau tiêm mũi nhắc lại lần 1; người đã mắc Covid-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1: trì hoãn 3 tháng sau khi mắc Covid-19.

Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng: Cộng thêm 1 mũi do tiêm mũi bổ sung (nếu tính số mũi tiêm).

