TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Hiện tượng đông máu khi tiêm vắc xin AstraZeneca ít xảy ra ở người trên 60 tuổi

10:30 23/04/2021

Tỷ lệ đông máu sau tiêm vắc xin AstraZeneca ở người trẻ cao hơn so với người lớn tuổi, đặc biệt lứa tuổi 20-29 tuổi. Sau tiêm vắc xin AstraZeneca, hiện tượng đông máu dường như ít xảy ra ở người trên 60 tuổi, chỉ khoảng 0,2/1 triệu liều tiêm đầu.



Ảnh minh họa.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã yêu cầu cảnh giác, theo dõi, phát hiện sớm và xử trí kịp thời những biến cố hiếm gặp ở người sau tiêm vắc xin Covid-19 nghi ngờ giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch, đông máu rải rác trong lòng mạch, huyết khối tĩnh mạch não.

Tỷ lệ huyết khối sau tiêm vắc xin AstraZeneca là 4,6/1 triệu liều tiêm thứ nhất, vắc xin Pfizer-BioNTech Covid-19 là 0,2/1 triệu liều tiêm thứ nhất. Huyết khối sau tiêm vắc xin AstraZeneca chủ yếu gặp ở nữ, tại Đức có 29/31 bệnh nhân

huyết khối là nữ.

Tỷ lệ đông máu sau tiêm vắc xin AstraZeneca ở người trẻ cao hơn so với người lớn tuổi, đặc biệt lứa tuổi 20-29 tuổi. Sau tiêm vắc xin AstraZeneca, hiện tượng đông máu dường như ít xảy ra ở người trên 60 tuổi, chỉ khoảng 0,2/1 triệu liều tiêm đầu.

Theo Bộ Y tế, tại các cơ sở y tế xã, phường, trung tâm y tế quận, huyện hoặc tương đương hạng IV cần theo dõi người sau tiêm vắc xin. Nếu xuất hiện ít nhất 1 trong các triệu chứng lâm sàng trên, cần chuyển người sau tiêm vắc xin Covid-19 lên tuyến cao hơn hoặc xử lý cấp cứu nếu có.

Trường hợp tại các bệnh viện tuyến huyện, quận hoặc tương đương hạng III, sau khi tiêm xuất hiện một trong các triệu chứng trên cần thực hiện các xét nghiệm: Đếm số lượng tiểu cầu; các xét nghiệm đông máu cơ bản; xét nghiệm định lượng D-dinmer; các thăm dò siêu âm, X-quang... Trường hợp sau tiêm xuất hiện các triệu chứng cần chuyển lên tuyến cao hơn xử lý.

Tại các tuyến cơ sở y tế tỉnh, thành phố hoặc tương đương hạng II cần thực hiện các xét nghiệm cơ bản đếm số lượng tiểu cầu, xét nghiệm đông máu cơ bản; xét nghiệm định lượng D-dimer; các xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh đánh giá tình trạng huyết khối, chảy máu; thực hiện các thăm dò khác nếu có. Trường hợp vượt quá khả năng chuẩn đoán và điều trị, cần hỏi ý kiến chuyên gia cấp cao hơn.

Tại các tuyến cơ sở trung ương hoặc tương đương hạng I, hạng đặc biệt sẽ tiếp nhận người sau tiêm vắc xin có biến chứng nặng do các tuyến chuyển đến, đồng thời thực hiện tất cả các thăm dò cần thiết để chẩn đoán và điều trị theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế; tham vấn ý kiến của các chuyên gia khi cần.

Cũng theo Bộ Y tế, ngày 22-4, có thêm 20.203 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca. Như vậy, tính từ ngày 8-3 đến nay đã có tổng cộng 128.610 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca đợt 1 và đợt 2 tại 28 tỉnh, thành phố và chưa ghi nhận trường hợp bị đông máu sau tiêm.

PV