

Việt Nam đã xuất hiện biến thể phụ BA.2.12.1 của Omicron

18:31 21/07/2022

Thông tin trên được TS. Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cho biết tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2022 chiều 21/07.



Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Y tế.

Theo đó, trong tuần qua, trong số hơn 30 mẫu được làm giải trình tự gen do Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh thực hiện thì biến thể phụ BA.2 chiếm khoảng 30%, còn lại là BA.4, BA.5, đồng thời phát hiện thêm cả biến thể phụ BA.2.12.1. Biến thể BA.2.12.1 cũng có khả năng lẫn tránh miễn dịch nhưng ít hơn BA.4, BA.5.

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, những ngày qua, Việt Nam ghi nhận khoảng 900 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày. Ngoài ra, trong cộng đồng nhiều người dân sau khi đã tiêm mũi cơ bản hoặc đã mắc Covid-19 có tâm lý

chủ quan.

Báo cáo về tình hình dịch bệnh phía Bắc, TS. Ngũ Duy Nghĩa, Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) cho biết: 06 tháng đầu năm các tỉnh miền Bắc ghi nhận gần 07 triệu ca Covid-19 (chiếm 95% tổng số ca mắc của cả toàn bộ đợt dịch từ đầu năm đến nay), chủ yếu là trong cộng đồng, số nhỏ ca xâm nhập. Đỉnh dịch rơi vào tháng 03/2022 với 5 triệu ca mắc, sau đó giảm dần, đến nay mỗi tháng ghi nhận khoảng gần 20.000 ca.

Về kết quả giải trình tự gen, trong số hơn 360 mẫu được giám sát từ đầu năm thì phát hiện chủ yếu là chủng Omicron. Từ tháng Sáu, khu vực này phát hiện thêm biến thể phụ của Omicron là BA.5 tại Hà Nội và sau đó là tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Bình, Nghệ An và Hải Dương.

Về tình hình dịch tại phía Nam, TS. Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh thông tin, số ca mắc Covid-19 tại các tỉnh khu vực phía Nam giảm dần trong thời gian qua và thấp nhất vào tuần 24-26 sau đó có sự gia tăng nhẹ từ tuần 27 đến nay.

Về kết quả giải trình tự gen, Phó Viện trưởng Nguyễn Vũ Thượng thông tin: Những tuần trước biến thể phụ BA.2 chiếm chủ yếu tại khu vực phía Nam. Tuy nhiên, 3-4 tuần gần đây lại xuất hiện ổ dịch của chủng Delta làm tăng số ca mắc.

Việc tăng tỷ lệ nhiễm BA.2.12.1, BA.4 và BA.5 đi kèm với tăng mắc mới. Ở một số quốc gia, sự gia tăng ca bệnh cũng dẫn đến sự gia tăng số ca nhập viện, nhập ICU và tử vong. BA.4 và BA.5 có khả năng lây tránh miễn dịch tốt hơn so với biến thể gốc của Omicron.

"BA.4, BA.5 có hiệu giá kháng thể trung hòa thấp hơn khoảng 7,5 lần so với BA.1. BA.4, BA.5 có khả năng kháng với kháng thể vaccine cao gấp 3-4 lần so với các biến thể cũ của Omicron. BA.2.12.1 tăng 1.8 lần khả năng kháng với kháng thể tạo ra từ vaccine so với BA.2. Do đó, nếu chúng ta không làm tốt các biện pháp phòng chống dịch thì dự báo ca mắc sẽ gia tăng", Phó Viện trưởng Nguyễn Vũ Thượng nhấn mạnh.

NK