

Phát hiện ca nhiễm biến thể mới XE đầu tiên tại Nhật Bản


21:21 11/04/2022

Biến thể XE là biến thể tái tổ hợp giữa hai biến thể phụ BA.1 và BA.2 của dòng Omicron. Biến thể XE có thể là biến thể dễ lây truyền nhất cho đến nay, ước tính là lây lan dễ dàng hơn 10% so với BA.2.

Ngày 11/04, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo ca nhiễm biến thể mới mang tên XE đầu tiên ở nước này là một phụ nữ đến từ Mỹ và xuống sân bay Narita vào ngày 26/03.

Biến thể XE là biến thể tái tổ hợp giữa hai biến thể phụ BA.1 và BA.2 của dòng Omicron.

Kết quả nghiên cứu sơ bộ do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổng hợp, thì XE được phát hiện lần đầu ở Anh vào ngày 19/1 và hơn 600 mẫu phân tích chuỗi gene được xác nhận là biến thể XE.



Ảnh minh họa: Reuters.

Những ước tính từ những ngày đầu cho thấy XE có tốc độ tăng trưởng lây nhiễm trong cộng đồng cao hơn BA.2 khoảng 10%. Tuy nhiên, điều này cần thêm thời gian và nghiên cứu để khẳng định.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, sự lai tạo của 2 biến thể phụ của Omicron là BA.1 và BA.2 đã được ghi nhận ở Anh. Biến thể mới này là XE và có thể là biến thể dễ lây truyền nhất cho đến nay. Biến thể mới XE được ước tính là lây lan dễ dàng hơn 10% so với BA.2. Bản thân BA.2 đã dễ lây lan hơn so với chủng gốc Omicron vì dễ thâm nhập.

Trước Ấn Độ, ca nhiễm biến thể mới XE đầu tiên đã được ghi nhận ở Thái Lan trong ngày 02/04. Tiếp đó là các ca được ghi nhận tại Ấn Độ ngày 06/04 và 09/04.

Minh Anh (T/h)