TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Phát hiện hơn 100 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại Nghệ An

13:54 27/12/2023

Hiện nay, diễn biến dịch tả lợn Châu Phi tại Nghệ An diễn biến khá phức tạp, đặc biệt diễn ra nghiêm trọng tại các địa phương có tổng đàn chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh như Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương, Hưng Nguyên...

Phát hiện hơn 100 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại Nghệ An (Ảnh: internet)

UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định cấp 5.000 lít hóa chất Han-Iodine 10% từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 địa phương phòng chống dịch bao gồm: Anh Sơn, TP. Vinh, Yên Thành, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương.

Huyện Yên Thành là địa phương được cấp nhiều nhất với gần 1.500 lít. Từ ngày 12/10 đến nay, trên địa bàn huyện Yên Thành có thêm 06 xã bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. UBND huyện cũng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch. Hiện nay, huyện Yên Thành có hơn 82.500 con lợn.

Tại huyện Anh Sơn, đến ngày 21/12, có 11 ổ dịch tại các xã: Long Sơn, Phúc Sơn, Hội Sơn, Thạch Sơn, Cao Sơn, Tam Sơn, Tào Sơn, Lĩnh Sơn, Bình Sơn, Đức Sơn, Lạng Sơn.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, bên cạnh quyết định cấp 5.000 lít hóa chất mới đây thì từ đầu năm đến nay, tỉnh Nghệ An đã cấp hơn 20.000 lít hóa chất từ các đợt trước để phân khai cho các địa phương phòng dịch. Đối với vôi bột khử khuẩn, hiện nay, các địa phương đang tự trích kinh phí để mua hỗ trợ bà con.

Hiện nay, các biện pháp phòng chống dịch đang được thực hiện đồng bộ tại địa phương. Đối với những con lợn có triệu chứng, người dân báo lên chính quyền địa phương để cử cán bộ thú y xuống lấy mẫu. Sau khi mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi sẽ tiến hành khoanh vùng, sát trùng khử khuẩn khu vực chăn nuôi và tiêu huỷ lợn theo quy định.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ lập chốt kiểm dịch, kiểm soát người và phương tiện ra vào vùng dịch, đảm bảo lợn bệnh, chết sẽ không bị buôn bán ra ngoài thị trường, hạn chế tối đa dịch lây lan.

PV*(t/h)*