


Quinvaxem có an toàn?

03:14 11/11/2015



THCL Mỗi năm, tại Việt Nam có khoảng 1,7 triệu trẻ em trong độ tuổi tiêm vắc xin Quinvaxem theo chương trình tiêm chủng mở rộng từ tháng 6/2010. Vắc xin Quinvaxem phòng được các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn Hib.



Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, đã có 16 ca phản ứng nặng sau khi tiêm vắc xin Quinvaxem được báo cáo. Trong đó, 8 ca tử vong, 1 ca sốc phản vệ, 7 ca ngẫu nhiên. Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục dùng vắc xin Quinvaxem trong tiêm chủng mở rộng.

Liên tiếp những ngày gần đây, dư luận lan truyền thông tin cho rằng vắc xin Quinvaxem được sản xuất tại Hàn Quốc, đưa vào Việt Nam thử nghiệm, khiến người dân hoang mang.

Ngày 10/11, cung cấp thông tin cho báo chí, ông KOHEI KODA – chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hiện vắc xin Quinvaxem đã được sử dụng tại 94 nước trên toàn thế giới với số lượng khoảng 449 triệu liều. Tại khu vực Đông Nam Á, vắc xin này được sử dụng tại Thái Lan, Philippines, Campuchia, Lào và Việt Nam. Ngoài Quinvaxem, các vắc xin có chứa thành phần ho gà toàn tế bào cũng được sử dụng rộng rãi tại 131 quốc gia.

Vắc xin Quinvaxem đã được WHO tiến thẩm định về chất lượng vào năm 2006. Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam đã sử dụng khoảng 24,9 triệu liều. Trong quá trình sử dụng, đã ghi nhận một số trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. Tất cả các trường hợp tai biến nặng nêu trên đều được tiến hành điều tra, báo cáo kịp thời.

Các hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế cấp tỉnh đã xem xét từng trường hợp và quy trình tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Công tác điều tra, đánh giá, kết luận nguyên nhân các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng đã được thực hiện minh bạch.

Cũng theo ông KODA, việc đánh giá tai biến nặng sau tiêm chủng đã được cải thiện với độ nhạy tăng, kèm theo nhiều trường hợp được báo cáo trong những năm gần đây. Tỷ lệ tai biến nặng liên quan đến vắc xin bạch hầu - ho gà (toàn tế bào) - uốn ván đến nay là 4,5/1 triệu liều vắc xin sử dụng, trong khi tỷ lệ theo thống kê của WHO là 1- 20/1 triệu liều). Tỷ lệ trẻ tử vong sau tiêm vắc xin Quinvaxem không tăng so với các năm trước. Các trường hợp tử vong này chủ yếu do trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý khác.

Ông KODA nhấn mạnh: Thời gian gần đây đã ghi nhận một số ca mắc bệnh ho gà ở Việt Nam và xảy ra ổ dịch bạch hầu ở một số nước láng giềng. Quinvaxem là vắc xin cần thiết để phòng chống các bệnh trong tiêm chủng mở rộng ở trẻ em. WHO vẫn khuyến cáo sử dụng vắc xin có thành phần ho gà toàn tế bào để tạo miễn dịch phòng bệnh tốt hơn.

Quinvaxem là vắc xin an toàn - hiệu quả có chất lượng tốt và chi phí hợp lý theo kết quả thẩm định của WHO. Tất cả các bà mẹ cần lưu ý thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế và tiếp tục đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, không chậm trễ. “WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để bảo đảm việc sử dụng vắc xin an toàn”, ông KODA khẳng định.

Trần Nguyên (Thương hiệu & Công luận)