

Tăng cường an toàn sinh học, ứng phó dịch tả lợn châu Phi

05:45 24/10/2025

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi (ASF), Liên minh Đối mới sáng tạo về An toàn sinh học trong chăn nuôi lợn đang đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và hợp tác nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi Việt Nam. Ngày 23/10, tại Hà Nội, Liên minh đã tổ chức hội thảo tham vấn, công bố kết quả nghiên cứu mới về thực hành an toàn sinh học tại các hộ chăn nuôi.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Chăn nuôi quốc gia (NIAS), Cơ quan Khoa học quốc gia Australia (CSIRO) và Đại học Charles Sturt (CSU), với sự hỗ trợ của Chương trình Aus4Innovation. Dữ liệu khảo sát tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi cho thấy, nhiều tập quán chăn nuôi truyền thống vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Các chuyên gia khuyến nghị người chăn nuôi cần áp dụng những biện pháp thiết thực như kiểm tra chất lượng nước định kỳ, cách ly đàn lợn mới nhập và vệ sinh chuồng trại nghiêm ngặt. Việc đảm bảo nước sạch có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tới 5 lần, trong khi tuân thủ cách ly và vệ sinh cá nhân có thể giảm nguy cơ tới 6-10 lần.



Phòng chống dịch tả lợn châu Phi một cách hiệu quả.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, hiệp hội và người chăn nuôi cùng thảo luận giải pháp phù hợp cho từng địa phương. Nhiều mô hình đơn giản, chi phí thấp như đặt bồn khử trùng ở lối vào chuồng, kiểm soát người ra vào khu nuôi hay thực hiện cách ly nghiêm ngặt được xem là biện pháp hiệu quả, dễ nhân rộng.

Theo Tiến sĩ Kim Wimbush, Tham tán CSIRO kiêm Giám đốc Chương trình Aus4Innovation, Liên minh An toàn sinh học là minh chứng cho sức mạnh hợp tác và đổi mới sáng tạo trong việc giải quyết các thách thức của ngành nông nghiệp. “Chúng tôi đang cùng nông dân, nhà khoa học và cơ quan quản lý xây dựng nền tảng cho chăn nuôi lợn bền vững, có khả năng chống chịu cao,” ông nói.

Tiến sĩ Phạm Công Thiếu, Viện trưởng Viện Chăn nuôi quốc gia, cho biết tính đến nay đã có 648.000 con lợn buộc phải tiêu hủy do ASF, cho thấy sự cấp bách của việc hành động chung tay. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, 1.780 ổ dịch đã xuất hiện tại 34 tỉnh, thành, tiếp tục gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi và chuỗi cung ứng thực phẩm.

Nam Sơn (t/h)