TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

WHO: Khoảng 14.700 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Châu Phi

13:10 12/01/2025

Báo cáo mới nhất của WHO cho thấy, đợt bùng phát đang diễn ra do nhiều nhánh của virus, bao gồm cả biến thể Clade Ib, đang lây lan chủ yếu ở CHDC Congo và các quốc gia lân cận.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/1 công bố, khoảng 14.700 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận, bao gồm 66 ca tử vong, đã được báo cáo tại 20 quốc gia châu Phi từ tháng 1/2024 đến ngày 5/1/2025.



Đậu mùa khỉ là bệnh hiếm gặp, song lại đang lây lan mạnh ở châu Phi. Ảnh: BBC

“Các ca mắc bệnh được xác nhận chỉ là một phần nhỏ trong số các ca nghi ngờ. Trước đó, một số lượng lớn các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nghi ngờ vẫn chưa được xét nghiệm và “do đó không bao giờ được xác nhận” tại một số quốc gia châu Phi do năng lực chẩn đoán hạn chế”, theo WHO.

Báo cáo mới nhất của tổ chức này cũng cho thấy, đợt bùng phát đang diễn ra do nhiều nhánh của virus, bao gồm cả biến thể Clade Ib, đang lây lan chủ yếu ở CHDC Congo và các quốc gia lân cận. Các ca mắc bệnh liên quan đến du lịch nhập khẩu do biến thể Clade Ib gây ra và lây truyền thứ cấp từ các ca mắc bệnh này cũng đã được phát hiện bên ngoài châu Phi.

“Các trường hợp nhập cảnh này chủ yếu là những người lớn đã đi du lịch trong thời gian ủ bệnh hoặc có triệu chứng sớm, với chẩn đoán được đưa ra khi họ đến các quốc gia khác”, WHO báo cáo.

Trước đó, cũng theo WHO, biến thể mới, lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Kivu, một tỉnh phía Đông của CHDC Congo, ước tính đã xuất hiện vào khoảng giữa tháng 9/2023.

Vào giữa tháng 8/2024, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi đã tuyên bố đợt bùng phát đậu mùa khỉ đang diễn ra ở châu lục này là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên quan đến an ninh lục địa. Ngay sau đó, WHO cũng tuyên bố đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên quan đến quốc tế, kích hoạt mức cảnh báo toàn cầu cao nhất đối với căn bệnh này lần thứ hai trong hai năm.



Hình ảnh bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: Reuters

Được biết, bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) lần đầu tiên được phát hiện ở khỉ trong phòng thí nghiệm vào năm 1958. Đây là một bệnh do virus hiếm gặp thường lây lan qua dịch cơ thể, các giọt hô hấp và vật liệu bị ô nhiễm. Nhiễm trùng thường gây sốt, phát ban và sưng hạch bạch huyết.

Trong một diễn biến có liên quan, Sierra Leone đã báo cáo trường hợp đầu tiên được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ kể từ khi mức cảnh báo cao nhất thế giới đối với căn bệnh do virus có khả năng gây tử vong này được nâng lên vào năm ngoái.

Sierra Leone là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Ebola, dịch bệnh đã tàn phá khu vực Tây Phi cách đây một thập kỷ khi khiến khoảng 4.000 người tử vong, trong đó có gần 7% là nhân viên y tế, trong giai đoạn 2014-2016.

PV (t/h)